

## BRACHIARIA RUZIZIENSIS

### Brachiaria Ruzizensis cv Ruzizensis

<b>Origen</b>	Zaire y Kenia inicialmente cultivado en el Congo.
<b>Nombre Científico</b>	Brachiaria Ruzizensis.
<b>Nombre Común</b>	Ruzizensis.
<b>Cultivar</b>	Ruzizensis.
<b>Ciclo Vegetativo</b>	Perenne.
<b>Forma de Crecimiento</b>	Decumbente.
<b>Altura</b>	1,00 a 1,50 m.
<b>Utilización</b>	Pastoreo, Henificación, Ensilaje, Abono Verde.
<b>Digestibilidad</b>	Muy buena.
<b>Palatabilidad</b>	Muy buena.
<b>Fertilidad del Suelo</b>	Baja.
<b>Tolerancia a la Sequía</b>	Buena.
<b>Tolerancia al Frío</b>	Media.
<b>Altitud</b>	0 a 2.000 m. s. n. m.
<b>Contenido Promedio de Proteína</b>	11 a 13%.
<b>Producción Media de Forraje</b>	15 a 18 ton. Ms/ha/año, de acuerdo al tipo de suelo y a la fertilización.
<b>Densidad de Siembra</b>	5 – 7 Kg. Con valor cultural superior a 76%.
<b>Profundidad de Siembra</b>	1 a 2 cm.
<b>Asociación</b>	Calopogonium, Kudzu, Maní Forrajero.
<b>Resistencia a Plagas</b>	Susceptible al mion o salivazo de los pastos.
<b>Época de Siembra</b>	Cuando la época de lluvias ya se encuentra bien establecida.
<b>Fertilización para el Establecimiento</b>	De acuerdo al análisis de suelo.
<b>Información Adicional</b>	Es muy similar a la Brachiaria Decumbens aportando mejor calidad de forraje, sirve de hospedero del mion o salivazo de los pastos.